


Recomendaciones de las guías de ASH, ISTH, NHF, FMH para el tratamiento de la enfermedad de Von Willebrand (EVW)



Qué abarcan

- Recomendaciones basadas en pruebas científicas para el tratamiento de la EVW en el contexto de cirugías mayores y menores, pruebas durante procedimientos invasivos, uso de desmopresina, y uso profiláctico de concentrado de factor Von Willebrand (FVW).



Por qué son importantes

- La EVW es el trastorno de la coagulación hereditario más común.
- Actualmente hay una gran variabilidad en la práctica clínica aplicada al tratamiento de la EVW debido a la falta de pruebas científicas de certeza elevada para orientar la toma de decisiones.
- Hay múltiples subtipos de la EVW que requieren tratamiento individualizado con base en el diagnóstico específico, así como una gama de síntomas y múltiples terapias disponibles para su tratamiento. Lo más conveniente tanto para el médico como para el paciente es contar con orientación para correlacionar el trastorno con el tratamiento adecuado.



A quiénes involucra

- **Hematólogos, médicos generales, internistas, ginecoobstetras, cirujanos, anesthesiólogos, dentistas (odontólogos)**
Las guías ofrecen recomendaciones para la toma de decisiones compartida, cuyo objetivo es incrementar el acceso a la atención de calidad para personas que viven con la EVW.
- **Personas con EVW**
Debido a que existe una amplia gama de síntomas y muchas terapias diferentes para el tratamiento de la EVW, son necesarias recomendaciones basadas en pruebas científicas a fin de mejorar el acceso a tratamientos adecuados y facilitar la terapia individualizada.



Cuáles son los aspectos relevantes

- Las guías hacen recomendaciones clave para abordar una amplia gama de manifestaciones de la EVW y las mejores prácticas para su tratamiento en entornos médicos o de otro tipo; entre ellas, las siguientes:
 - Profilaxis para hemorragias recurrentes frecuentes.
 - Pruebas con desmopresina para determinar la terapia.
 - Uso de agentes antiplaquetarios y terapia anticoagulante.
 - Lograr niveles ideales de actividad del FVW y del factor VIII para cirugías mayores.
 - Estrategias para reducir hemorragias durante cirugías menores o procedimientos invasivos.
 - Opciones de tratamiento para sangrado menstrual abundante.
 - Tratamiento de la EVW en el contexto de anestesia epidural durante el trabajo de parto y el nacimiento.
 - Tratamiento en el entorno posparto.

Número total de recomendaciones del panel: 12

Referencia: Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021;5(1):301-325. doi: <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020003264>

Para obtener más información sobre las Guías de ASH, ISTH, NHF, FMH para la enfermedad de Von Willebrand visite www.hematology.org/VWDguidelines

Las directrices de ASH son revisadas anualmente por grupos de trabajo formados por expertos convocados por ASH. Los recursos derivados de las directrices que requieren actualización se remueven del sitio web de ASH.